

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНСТРУКЦИЯ**

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**ГЕКСАСПРЕЙ**

**Регистрационный номер:** П N006694

**Торговое название:** ГЕКСАСПРЕЙ

**Международное непатентованное название:** Биклатимол

**Лекарственная форма:** аэрозоль для местного применения

**Состав на 1 флакон (30 г):**

*Действующее вещество:*

Биклотимол .....0,75 мг

*Вспомогательные вещества:*

Бензиловый спирт .....0,5 г

Динатрия эдетат .....0,0025 г

Метилпарагидроксибензоат .....0,025 г

Аниса обыкновенного семян масло...0,03 г

Аммония глицирризинат .....0,02 г

Натрия сахаринат .....0,05 г

Авицел РС 591 (Целлюлоза микрокристаллическая  
и кармеллоза натрия).....0,3 г

Лецитин соевый.....0,9 г

Глицерол.....1,0 г

Этанол 96 %.....1,06 г

Вода.....до 30,0 г

**Описание**

Однородная белая с желтым оттенком цвета суспензия с характерным запахом аниса

**Код АТХ:** R02AA20, A01AB11

**Фармакотерапевтическая группа**

Противомикробное средство.

**Фармакологические свойства**

Оказывает противомикробное действие (активен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*). Механизм действия обусловлен коагуляцией белков микробной клетки. Оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие.

**Фармакокинетические свойства**

Медленно всасывается через слизистую оболочку полости рта, оказывает длительное местное действие.

**Показания для применения**

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта (включая стоматиты, гингивиты), глотки, гортани, вызванные чувствительными к биклотимолу возбудителями.

Местное лечение воспалительных и инфекционных заболеваний носоглотки и дыхательных путей (острый и хронический фарингит, фаринголарингит, тонзиллит, состояния после тонзиллэктомии, глоссит).

#### **Противопоказания для применения**

Детский возраст до 6 лет.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

#### **Способ применения и дозы**

Местно: по 2 дозы аэрозоля 3 раза в день независимо от приема пищи.

Продолжительность лечения не должна превышать 10 дней. При необходимости продолжения лечения на больший срок необходима консультация врача.

#### **Меры предосторожности при применении**

Не применимо

#### **Передозировка**

Нет данных о случаях передозировки.

#### **Побочное действие**

Возможны местные аллергические реакции.

В случае проявления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Избегать одновременного применения других местных средств.

*Стр. 3*

П N006694-301112

#### **Особые указания**

Во время использования флакон держать вертикально.

Перед применением взболтать.

#### *Схема применения*

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарата в периоды беременности и лактации не проводилось.

При беременности и лактации применение возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

#### **Влияние на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами**

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

#### **Форма выпуска**

Аэрозоль для местного применения 2,5 %. По 30 г в стеклянный флакон (тип стекла 3), покрытый снаружи пластиком (ПВХ), закрытый пластиковой крышкой с распылительным клапаном. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

#### **Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

Стр. 4

П N006694-301112

**Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:**

Лаборатории Бушара – Рекордати

70, авеню дю Женераль де Голль, иммебль «Ле Вельсон», 92800 Пюто, Франция

**Производитель:**

Лаборатории Бушара – Рекордати

70, авеню дю Женераль де Голль, иммебль «Ле Вельсон», 92800 Пюто, Франция

**Адрес места производства:**

Парк Мекатроник, 03410

Сен-Виктор, Франция

**Организация, принимающая претензии:**

ООО «Русфик», Россия.

123610 г. Москва,

Краснопресненская наб., д. 12

тел.: +7 (495) 225-80-01,

факс: + 7 (495) 258-20-07

E-mail: info@rusfic.com