

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**но медицинскому применению лекарственного препарата**  
**ЛОМЕКСИН**  
**LOMEXIN®**

**Регистрационный номер:** ЛСР-008990/10

**Торговое название:** Ломексин

**Международное непатентованное название:** Фентиконазол

**Химическое название:** 1-[(2RS)-2-(2,4- дихлорфенил)-2-[[4-(фенилсульфанил)бензил]окси]этил]-1H-имидазола нитрат

**Лекарственная форма:** капсулы вагинальные

**Состав на одну капсулу**

*Действующее вещество:*

Фентиконазола нитрат.....600 мг или 1000 мг

*Вспомогательные вещества:*

Лецитин соевый, парафин жидкий, петролатум.

*Состав оболочки:*

Глицерол, желатин, пропилпарагидроксибензоат натрия, титана диоксид, этилпарагидроксибензоат натрия.

**Описание**

Мягкие, овальные, блестящие капсулы желтоватого цвета, содержащие густую однородную маслянистую суспензию белого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антимикотическое действие (противогрибковое)

**Код АТХ:** G 01AF12

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Ломексин - противогрибковый препарат широкого спектра действия для местного применения в гинекологии. Фентиконазол (действующее вещество Ломексина) является синтетическим производным имидазола (его рацемическая смесь в форме азотнокислой соли фентиконазола). Оказывает местное фунгицидное и фунгистатическое действие. Обладает также антибактериальным и противовоспалительным действием. Механизм действия заключается в ингибировании синтеза эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной мембраны грибов. Активен в отношении дрожжевых грибов *Candida spp.* (включая *Candida albicans*) и грамположительных бактерий (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*), а также в отношении *Trichomonas vaginalis*.

В отличие от других известных азольных соединений (в частности, эконазола, миконазола и кетоконазола) фентиконазол ингибирует биосинтез протеаз *Candida spp.* При концентрациях ниже минимальной подавляющей концентрации - от 0,25 до 16 мкг/мл/. Это действие не зависит от величины антимикотической активности и обусловлено ингибированием одной из стадий образования протеолитических ферментов дрожжеподобными грибами.

**Фармакокинетика**

**Всасывание**

Ломексин практически не подвергается системной абсорбции, при длительном вагинальном применении, концентрация его в крови не определяется. Степень всасывания слизистыми оболочками крайне незначительна.

### **Показания к применению**

Вульвовагинальный кандидоз, вагинальный трихомоноз.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату, беременность, лактация, детский возраст. Препарат нельзя назначать во время менструации.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

В связи с недостаточностью данных безопасного применения препарата в периоды беременности и лактации, применение препарата в эти периоды не рекомендуется.

### **Способ применения и дозы**

Одну капсулу (600 мг или 1000 мг) вводят глубоко во влагалище в положении лежа перед сном однократно. При необходимости проводят повторное применение через 3 дня.

При лечении инфекций, вызванных *Trichomonas vaginalis* возможно повторное применение капсулы (600 мг или 1000 мг) через 24 часа.

При недостаточной эффективности возможно проведение повторного курса через 10 дней.

### **Побочное действие**

*Аллергические реакции:* крапивница, сыпь, эритема.

*Местные реакции:* жжение, зуд, раздражение в месте применения препарата.

Ломексин, как правило, хорошо переносится, побочные эффекты носят транзиторный характер и не требуют отмены препарата.

Если Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

### **Передозировка**

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не выявлено.

### **Особые указания**

При продолжительном применении препарата возможно развитие сенсibilизации.

В этом случае необходимо прекратить лечение и обратиться к лечащему врачу.

При отсутствии эффекта в течение 3 недель лечение следует прекратить и уточнить диагноз.

Курс лечения целесообразно начинать после менструации.

Во избежание реинфицирования рекомендуется одновременно проводить лечение партнера кремом (Ломексин, крем вагинальный 2 %), который наносят на головку полового члена и крайнюю плоть.

### **Влияние на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами**

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

### **Форма выпуска**

Капсулы вагинальные 600 мг и 1000 мг.

По 1 или 2 капсулы в блистер из ПВХ/ПВДХ - алюминиевой фольги.

Один блистер с инструкцией по применению в картонной пачке.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30 °С  
Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года

Не использовать препарат по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

**Владелец регистрационного удостоверения**

**Рекордати Ирландия Лтд,**

Рахинз Ист, Рингаскидди, Ко. Корк, Ирландия

**Производитель**

**Каталент Итали С.П.А.,**

Виа Неттуненсе км. 20, 100, Апрелья,  
Италия

**Организация, принимающая претензии:**

ООО «Русфик»

123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 6, пом. IАЖ

тел.: +7 (495) 225-80-01,

факс: +7 (495) 258-20-07

E-mail: info@rusfic.com