

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

ГЕКСАСПРЕЙ

Регистрационный номер: П N006694

Торговое название: ГЕКСАСПРЕЙ

Международное непатентованное название: Биклотимол

Лекарственная форма: аэрозоль для местного применения

Состав на 1 флакон (30 г):

Действующее вещество:

Биклотимол 0,75 г

Вспомогательные вещества:

Бензиловый спирт 0,5 г

Динатрия эдетат 0,0025 г

Метилпарагидроксibenзоат 0,025 г

Аниса звездчатого плодов масло 0,03 г

Аммония глицирризинат 0,02 г

Натрия сахаринат 0,05 г

Целлюлоза дисперсная 0,3 г

Лецитин соевый 0,9 г

Глицерол 1,0 г

Этанол 96 % 1,06 г

Вода очищенная до 30,0 г

Описание

Однородная белого с желтоватым оттенком цвета суспензия с характерным запахом аниса.

Код АТХ: R02AA20, A01AB11

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробное средство.

Фармакологические свойства

Оказывает противомикробное действие (активен в отношении *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp.). Механизм действия обусловлен коагуляцией белков микробной клетки. Оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие.

Фармакокинетические свойства

Медленно всасывается через слизистую оболочку полости рта, оказывает длительное местное действие.

Показания для применения

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта (включая стоматиты, гингивиты), глотки, гортани, вызванные чувствительными к биклотимолу возбудителями. Местное лечение воспалительных и инфекционных заболеваний носоглотки и дыхательных путей (острый и хронический фарингит, фаринголарингит, тонзиллит, состояния после тонзиллэктомии, глоссит).

Противопоказания для применения

Детский возраст до 6 лет.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Местно: по 2 дозы аэрозоля 3 раза в день независимо от приема пищи.

Продолжительность лечения не должна превышать 10 дней. При необходимости продолжения лечения на больший срок необходима консультация врача.

Меры предосторожности при применении

Не применимо.

Передозировка

Нет данных о случаях передозировки.

Побочное действие

Возможны местные аллергические реакции. В случае проявления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Избегать одновременного применения других местных средств.

Особые указания

Во время использования флакон держать вертикально. Перед применением флакон взболтать.



Беременность и грудное вскармливание

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарата в периоды беременности и лактации не проводилось.

При беременности и лактации применение возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

Форма выпуска

Аэрозоль для местного применения 2,5 %. По 30 г препарата в стеклянный флакон с наружным полимерным покрытием, с встроенным распылительным клапаном, покрытым полимерным колпачком, снабженным аппликатором – распылителем. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение

Лаборатории Бушара–Рекордати.

70, авеню дю Женераль де Голль, иммебль «Ле Вильсон», 92800 Пюто, Франция

Производитель

Лаборатории Бушара–Рекордати.

70, авеню дю Женераль де Голль, иммебль «Ле Вильсон», 92800 Пюто, Франция

Адрес места производства

Парк Мекатроник, 03410

Сен-Виктор, Франция

Организация, принимающая претензии:

ООО «Русфик»

123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 6, пом. IАЖ

тел.: +7 (495) 225-80-01,

факс: +7 (495) 258-20-07

E-mail: info@rusfic.com